

急性感音難聴



急性感音難聴

突発性難聴

メニエル病

急性低音障害型
感音難聴

急性音響性
難聴

外リンパ瘻

聴神経腫瘍

ある日突然、または2~3日
の間に生じる難聴です



突発性難聴

治療

- 最も重要なのは、心身の安静です
- ステロイドの投与が標準治療です（内服または点滴で治療します）
- 緊急入院が必要になることもあります

予後

- 30% 完治
- 50% 改善するが、完治には至らない
- 20% ほとんど改善しない

治りにくい因子

- 発症2週間以上を経過した症例
- 高度の難聴で発症
- 回転性めまいを伴う症例
- 高齢者

適切な時期に最善を
尽くす治療が大切です



メニエル病

めまい=メニエル病ではありません
適切な診断、治療、経過観察が必要です

症状と特徴

- ・ 回転性めまい（ぐるぐる回る）の発作
- ・ めまい発作の前または同時に難聴、耳鳴、耳がつまった感じが起こります
- ・ 同じ症状を繰り返すのが特徴です

治療

- ・ めまい発作の治療
- ・ 難聴の治療
- ・ 症状がないときでも経過観察が20% ほとんど改善しない

発作を予防するには

- ・ 有酸素運動
- ・ 水分大量摂取（1日2リットル程度）
- ・ 睡眠障害の治療
- ・ めまいリハビリ
- ・ 中耳の加圧治療
- ・ めまいが頻発するまたは短期間に難聴が進行する症例では手術をすることもあります



り耳鼻咽喉科

急性低音障害型感音難聴

症状と特徴

- 耳閉感が最も多く、耳鳴、難聴、自声強調などがあります
- 仕事で忙しい20~30才代の女性によく起こります
- 治りやすいですが、4人に1人が繰り返します

治療

- イソバイド
- ステロイド
- 漢方薬 (柴苓湯)

治りやすいけど、繰り返すのが特徴です
前にかかって、すぐ治ったから今回も大丈夫・・・と甘く考えず、すぐに受診して下さい

ステロイドの適応

- 高度の難聴で発症
- イソバイドで治りが悪い
- 高音域も低下している症例

